

# INFORMATION EFTER BEDØVELSE OG OPERATION

Pasning og eftersyn af hunde og katte efter operation

## Operation af bidsår og bylder

Mange typer bidsår og sår efter bylder kræver, at der lægges dræn i. Drænet består typisk af blød plastisk, der ligger under huden og kommer ud gennem to eller flere huller. Drænets formål er at trække væske og pus ud af såret således, at det ikke hæver, og at betændelsen ikke ophobes i vævet. Det er derfor vigtigt at åbningerne, hvor drænet kommer ud, holdes rene og åbne. Det gøres lettest med lidt klorhexidin på en tot vat. Dræn skal normalt sidde i 3-5 dage.


## Forbindinger, gips og lignende

Det er meget vigtigt at bandager holdes tørre. Der er typisk meget vat og lignende inde i bandager, der kan suge store mængder væske. Det vil sige at dyret ikke må gå i vandpytter eller slikke på forbindingen. Hundens forbindinger kan pakkes ind i en pose under gåture. Posen skal tages af når du kommer hjem. En normal forbindelse må ikke lugte dårligt eller føles fugtig. Dyret må normalt ikke hoppe eller lege voldsomt. Det vil sige at hunde f.eks. kun skal luftes i kort snor og skal løftes op og ned af trapper. Katte skal holdes inde – også selvom det nogle gange kan være frustrerende for både katten og ejer.

## Aftalt tid til kontrol

Dato \_\_\_\_\_

Tidspunkt \_\_\_\_\_



Husum Dyreklinik  
Frederikssundsvej 326  
2700 Brønshøj  
3828 7712  
[www.husumdyreklinik.dk](http://www.husumdyreklinik.dk)

## Opvågning efter bedøvelse

Der findes mange forskellige slags bedøvelsesmidler. Nogle har kortere opvågningstid end andre. Desuden vil dyrets helbredstilstand, samt operationens længde og omfang også have indflydelse på, hvor længe opvågningen varer.

Til de fleste større operationer vil dyret være blevet intuberet. Det betyder at dyret har fået lagt en gummislange ned i luftrøret, hvor der kan tilføres ilt og bedøvelse. Dette kan irritere luftrøret og kan derfor give hoste.

Resten af opvågningen hjemme bør foregå i rolige og varme omgivelser. Dyret skal altså helst holdes fra andre dyr og børn. Katte skal normalt holdes inde i mindst en dag efter bedøvelsen.

## Operationssår

Et operationssår kan være ømt, så undgå at røre ved det, når det ikke er nødvendigt. Der vil normalt komme en smule hævelse og rødmen langs kanten, men dette må ikke brede sig. Er den røde kant bredere end en fingers bredde eller er området svulmet, bør du kontakte os. Ligeledes bør et operationssår ikke skifte farve til f.eks. lilla, grå eller sort og der bør ikke komme pus (det gælder dog ikke, hvis der er lagt dræn i – se senere). Et normalt operationssår er tørt og ensartet at se på.

Undgå desuden at dyret gnaver eller slikker i såret, da det vil sænke helingen og måske endda få stingene til at gå op.

## Fjernelse af sting

Sting skal normalt fjernes efter 10-12 dage og dette skal du bestille en tid til på klinikken.

## Fodring

Nogle typer af bedøvelse giver kvalme og det kan derfor være en god idé at fodre mindre portioner end normalt de første 24 timer.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at bruge specialkost, men de fleste skal blot have deres normale foder. Du vil få at vide på klinikken, hvis der er behov for speciel diæt.

## Motion efter bedøvelse

Det er bedst at holde dyret i ro i minimum 24 timer. Det vil sige at katte ikke må komme ud og at hunde skal luftes på korte ture og i kort snor. Det gælder også selvom dyret selv mener noget andet. Motionen afhænger af hvilket indgreb, der er foretaget. Spørg dyrlægen eller veterinærsygeplejersken om, hvor meget motion dit dyr må få.

## Klorhexidin til sårrens

Klorhexidin er effektivt til sårrens. Det dræber bakterier uden at skade huden og det svier ikke i selv større sår. Det binder til det yderste hudlag, så der er en bakteriedræbende effekt i timerne efter, du har brugt det. Hæld lidt på vat eller køkkenrulle og dup såret forsigtigt – især rundt langs kanten. Hvis der har samlet sig snavs i såret, skal det også forsigtigt renses af.

Du kan købe klorhexidin på klinikken eller på apoteket.

