

INFORMATION EFTER NEUTRALISATION

STERILISATION OG KASTRATION AF KATTE

Efter bedøvelsen


Nogle katte vil være vågne og opføre sig næsten normalt samme aften, som de har været bedøvet. Andre vil sove mere end normalt og evt. gemme sig. Dette er en naturlig reaktion på bedøvelsen, og vil fortage sig indenfor det første døgn. Hold øje med at katten ikke bliver for kold, da den kan sove tungere end den ellers gør. Normal temperatur for en kat er: 37,5 – 39,0 grader. Er katten for kold eller meget trist bør du ringe til os, da det kan være en god ide, at vi ser katten til kontrol. Bedøvelse kan desuden give kvalme, som oftest kommer til udtryk ved salven og mild spisevægring. Det kan derfor være en god ide at give lidt mindre foder end normalt den første dag. Giv det også gerne i flere mindre portioner.

Øremærkning

Er din kat også blevet øremærket, vil den have grøn eller sort farvestof i ørerne. Det skal blive siddende for at kunne trænge ordentligt ind i huden. Farven vil tørre ind og falde af inden for de første 7-10 dage og er ikke giftigt for katten, hvis den skulle slikke sig. Det kan være svært at fjerne farven fra tæpper og møbler, hvis den bliver våd. Farven fjernes nemmest med en støvsuger, kost eller evt. sulfosæbe.



Felina er stadig lidt træt efter operationen og øremærkningen.



Husum Dyreklinik
Frederikssundsvej 326
2700 Brønshøj
3828 7712
www.husumdyreklinik.dk

Neutralisering

Neutralisering er et kirurgisk indgreb, hvor man fjerner det væv, der er ansvarligt for produktionen af enten æg- eller sædceller samt produktion af kønshormoner. I daglig tale kaldes det hos hundyr sterilisation og hos handyr kaldes det kastration.

Adfærsændringer

Både æggestokkene og testiklerne producerer kønshormoner. Hankatte har bl.a. testosteron og hunkatte bl.a. østrogen. Disse hormoner styrer kønsdriften og lysten til at holde et territorium. Når hormonerne er væk, vil adfærd, der har med dette at gøre, også blive svagere. Der er meget stor forskel på, hvordan katte reagerer. Nogle vil næsten ikke ændre sig, mens andre vil blive mere afslappede og kælne.

Vægtforøgelse og foderoptag

Kønshormonerne regulerer også stofskiftet. Når en kat efter neutralisering ikke længere producerer den samme mængde hormoner, vil stofskiftet nedsættes og der er øget tendens til overvægt. Det betyder at mange katte har brug for mindre mad end før operationen. Det kan være en god ide at skifte kattens foder ud med noget, der er specielt rettet mod neutraliserede katte og som indeholder færre kalorier.

Operationen på hankatte

På hankatte fjernes testiklerne, og der slås en knude på blodkarret og sædstrengen. Det er ikke nødvendigt at sy operationssåret på hankatte, da dette heler bedre uden syning. Der kan komme lidt væske fra såret de første timer efter operationen, men senere skal såret være tørt og

ensartet at se på. Området kan være en smule hævet, men må ikke være opsvulmet og rødt. Rensning af såret er normalt ikke nødvendigt.


Operationen på hunkatte

Normalt fjernes kun æggestokkene, men i nogle tilfælde fjernes hele livmoderen. Det vil give et lidt større operationssår, men udover det, vil hverken du eller katten kunne mærke forskel. Operationssåret, der er lokaliseret på bugen, er syet i 3 lag men det er kun de yderste tråde er synlige. Det kan væske lidt fra såret den første dag, og kanten kan blive lidt rød og hævet. Det er normalt. Derimod må området ikke blusse op og blive rødt over en fingers bredde fra såret.

Hunkatte skal normalt have krave på efter operationen, da de ikke må slikke i såret. De kan slikke såret op og tilføre infektion fra tungen. Trådene i huden skal fjernes efter 10-12 dage. Til dette skal der bestilles tid.

Smertedækning

Både hun- og hankatte får smertestillende inden operationen, og der udleveres ligeledes smertestillende til efterbehandling de følgende dage. Dog får din kat ikke antibiotika i forbindelse med operationen, da denne udføres sterilt. Ved tegn på betændelse, herunder voldsom hævelse, rødme og lugt, skal katten tilses.



Operationssåret bliver syet i tre lag. Kun stingene i det yderste lag er synlige.