

# INFORMATION EFTER BEDØVELSE OG OPERATION

Pasning og eftersyn af kaniner og gnavere efter  
operation

Herudover kan du også tilbyde dyret en blanding Critical Care, som er et pulver, der opblandes med vand og evt. lidt frugtmos. Blandingen kan både gives i en skål eller i små portioner med en sprøjte direkte i munden. Critical Care indeholder en masse gavnlige fibre og vitaminer, som er super for en kanin eller marsvin med nedsat ædelyst. Hvis dyret ikke er begyndt at spise indenfor et halvt døgn, da bør du ringe til klinikken.

## Klorhexidin til sårrens


Klorhexidin er effektivt til sårrens. Det dræber bakterier uden at skade huden, og det svier ikke i såret. Det binder til det yderste hudlag, så der er en bakteriedræbende effekt i timerne efter brug. Hæld lidt på en tot vat, gaze eller køkkenrulle og dub såret forsigtigt – især rundt langs kanten. Snavs eller væske fra såret renses forsigtigt af.

Du kan købe klorhexidin på klinikken, i Matas eller på apoteket.

## Aftalt tid til kontrol

Dato \_\_\_\_\_

Tidspunkt \_\_\_\_\_



Husum Dyreklinik  
Frederikssundsvej 326  
2700 Brønshøj  
3828 7712  
[www.husumdyreklinik.dk](http://www.husumdyreklinik.dk)

### **Opvågning efter bedøvelse**

Når dyret kommer hjem efter bedøvelsen, vil det ofte være påvirket af resten af dagen, men dagen efter er dyret sig selv igen. Derfor skal det have ro og varme, samt være under opsyn de efterfølgende dage. Det er især vigtigt at holde øje, hvis dyret går sammen med en artsfælle.

Er det et dyr, der normalt står udendørs, bør den sove inde den første nat i de kolde måneder. Det behøver ikke nødvendigvis være i stuen, men et sted der er varmere end udenfor eksempelvis en garage.

Bedøvelsen gør nemlig, at dyret ikke selv kan holde sig varm.



### **Operationssår**

Et operationssår kan være ømt, så undgå at røre ved det, når det ikke er nødvendigt. Der vil normalt komme en smule hævelse og rødme langs kanten, men dette må ikke brede sig. Er den røde kant bredere end en fingers bredde eller er området hævet op, bør du kontakte os. Ligeledes bør et operationssår ikke skifte farve til f.eks. lilla, grå eller sort og der bør ikke komme væske fra såret. Et normalt sundt operationssår er tørt og ensartet at se på.

Undgå desuden at dyret gnaver eller slikker i såret da dette vil hæmme helingen, give anledning til betændelse og måske endda få stingene til at gå op.

Det er vigtigt at holde buret ekstra rent i 2 uger efter operationen. Der kan evt. bruges lagner og håndklæder som underlag i stedet for spåner, da de støver meget og kan sætte sig i operationssåret.

### **Fjernelse af tråde**

Trådene skal normalt fjernes hos os efter 10-12 dage, ellers følges dyrlægens anvisninger. Du er altid meget velkommen til at ringe til os hvis du er i tvivl.



### **Fodring**

Det er vigtigt at tilbyde dyret foder hurtigt efter hjemkomst og dermed sikre, at den kommer i gang med at spise igen. Både kaniner og marsvin tåler ikke at blive fastet. Der må gerne kræses lidt ekstra og gives grøntsager og græs, hvis dyret ikke har lyst til at spise det normale mad. Det kan være en fordel at give Fibreplex<sup>®</sup> som er en pasta, der indeholder gode fibre, gavnlige mikroorganismer og prebiotikum (næring til gode mikroorganismer i mavetarmkanalen). Dette hjælper desuden mod forstoppelse, hvilket kan ske efter operation og bedøvelse.

VEND →